


Was? Maßnahmen	Wann? Häufigkeit	Womit?		Wie? Durchführung
		Präparat / Produkt	Konz. / EWZ	
 Hygienische Händedesinfektion	Nach tatsächlicher wie vermutlicher Kontamination der Hände mit erregerehaltigen Materialien (z.B. Blut, Sekreten). Nach direktem Kontakt mit Kranken. <i>Auch wenn Handschuhe getragen wurden!</i>	Sterillium® Sterillium® classic pure - einreiben -	gebr.- fertig 30 Sek.	Ausreichend Hände-Desinfektionsmittel in die hohle Hand geben, so dass alle Areale vollständig benetzt werden können. Das Produkt sorgfältig über 30 Sekunden in die Hände einreiben und dabei alle Hautpartien erfassen. Besonderes Augenmerk auf die Fingerkuppen und Daumen legen.
	Chirurgische Händedesinfektion	Vor Arbeit am offenen Produkt. <i>Auch wenn Handschuhe getragen wurden!</i>	Sterillium® Sterillium® classic pure - einreiben -	gebr.- fertig 1,5 Min.
 Spezieller Hautschutz	Vor einer die Haut belastenden Tätigkeit. <i>Hautschutzprodukte sind kein Ersatz für Schutzhandschuhe!</i>	Baktolan® protect + pure - einreiben -	gebr.- fertig	Produkt entnehmen und gründlich in die sauberen, trockenen Hände einreiben. Dabei mit dem Handrücken beginnen und besonders auf Fingerzwischenräume und Nagelbetten achten.
 Händepflege	Nach einer die Haut belastenden Tätigkeit. Insbesondere in Pausen und nach Arbeitsende.	Baktolan® balm pure Baktolan® lotion pure - einreiben -	gebr.- fertig	Produkt auf den Handrücken geben, von dort gleichmäßig in beide Hände einmassieren. Pflegefilm einziehen lassen. Fingerzwischenräume und Nagelbetten beachten.
 Händereinigung	Vor Arbeitsbeginn um mögliche Sporen zu entfernen. Bei sichtbarer Verschmutzung. Nach Toilettenbesuch. Nach dem Naseputzen.	Baktolin® basic pure - waschen -	gebr.- fertig	Hände mit Wasser anfeuchten, Produkt entnehmen und aufschäumen. Anschließend Hände gründlich abspülen und mit Einmalhandtuch trocknen.
 Handschuhe - steril - Handschuhe - unsteril -	Vor der aseptischen Herstellung applikationsfertiger Parenteralia.	Peha-soft® nitrile sterile		Handschuhe über desinfizierte, trockene Hände streifen.
	Vor Kontakt mit offenen Produkt. Vor Arbeit mit hautunverträglichen oder färbenden Substanzen. Vor Kontakt der Hände mit erregerehaltigen Materialien (z.B. Blut, Sekreten). Vor kleineren Reinigungsarbeiten.	Peha-soft® nitrile white		Handschuhe über trockene ggf. desinfizierte Hände streifen.
 Mund- und Nasenschutz Kopfhaube Schutzbrille	Bei der Arbeit am offenen Produkt.	Foliodress® mask Comfort Loop		Mund- und Nasenschutz anlegen.
	Bei Kontakt mit sehr feinstaubenden Feststoffen.	FFP 2		
	Bei der Arbeit am offenen Produkt.	Foliodress® cap Comfort Universal		Hauben müssen so aufgesetzt werden, dass das gesamte Haar verdeckt ist.
	Bei Kontakt mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, deren Substanzen die Augen reizen. Bei Kontakt mit Säuren, Laugen, Lösungsmitteln und Pulvern, deren Stäube die Augen reizen. Bei Kontakt mit ätzenden Stoffen, die verspritzen können.	Foliodress® Eye protect		Schutzbrille aufsetzen.
	 Schutzkittel	Bei der Arbeit im Labor. Bei der Arbeit mit gesundheitsschädigenden Stoffen.	Foliodress® S	
 Aufbereitung von Dosier- und Spenderpumpen Aufbereitung des Spendergehäuses	Bei jedem Flaschenwechsel.	Warmes Wasser		Zum Entfernen von Produktresten mit angefeuchtetem Einmaltuch abwischen und durchspülen.
	Bei jedem Flaschenwechsel.	Bacillo® AF - wischen/sprühen -	gebr.- fertig 30 Sek.	Desinfektionsmittel durchspülen, einwirken lassen und Pumpe anschließend leer pumpen. Nicht nachwischen. Nach Trocknen einsetzen oder staubfrei lagern.
 Flächen-desinfektion - Fläche (allgemein) - Messplatz  - Personenwaage	Nach tatsächlicher wie vermutlicher Kontamination mit erregerehaltigen Materialien.	SCHNELLEDESINFEKTION: Bacillo® AF - wischen/sprühen - ALTERNATIV	konz. 30 Sek.	Flächen mit einem Desinfektionsmittel befeuchteten Einmaltuch abwischen. Vollständig benetzen, nicht nachwischen. Unzugängliche Flächen einsprühen. Beim Sprühen auf eine vollständige Benetzung achten.
	Messplatz zur Bestimmung von Blutparametern nach Gebrauch bzw. täglich. Personenwaage nach Gebrauch bzw. täglich.	Bacillo® Tissues - wischen -	gebr.- fertig 30 Sek.	Alternativ gebrauchsfertiges Einmaltuch entnehmen, wischen und anschließend entsorgen.
 Flächen-desinfektion - produktberührende Geräte im Herstellungsbereich	Vor Herstellungsbeginn ggf. im Voraus. Bei Bedarf. Nach tatsächlicher wie vermutlicher Kontamination mit erregerehaltigen Materialien.	SCHNELLEDESINFEKTION: Bacillo® AF - wischen/sprühen - ALTERNATIV	konz. 30 Sek.	Flächen mit einem Desinfektionsmittel befeuchteten Einmaltuch abwischen. Vollständig benetzen, nicht nachwischen. Unzugängliche Flächen einsprühen. Beim Sprühen auf eine vollständige Benetzung achten.
		Bacillo® Tissues - wischen -	gebr.- fertig 30 Sek.	Alternativ gebrauchsfertiges Einmaltuch entnehmen, wischen und anschließend entsorgen.
		Dismozon® plus - wischen -	0,4 % 1 Std.	Flächen mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem, sauberen Tuch abwischen. Gleichmäßig benetzen. Nicht nachtrocknen.
 Flächen-desinfektion - Abfalleimer	Bei Bedarf bzw. bei tatsächlicher oder vermutlicher Kontamination mit erregerehaltigem Material.	Dismozon® plus - wischen -	0,4 % 1 Std.	Von außen und innen gründlich mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem angefeuchteten Tuch auswischen. Dabei immer von außen nach innen arbeiten.
 Laminar-Air-Flow	Täglich und vor jeder Tätigkeit.	SCHNELLEDESINFEKTION: Bacillo® AF - wischen/sprühen - ALTERNATIV	konz. 30 Sek.	Flächen mit einem Desinfektionsmittel befeuchteten Einmaltuch abwischen. Vollständig benetzen, nicht nachwischen. Unzugängliche Flächen einsprühen. Beim Sprühen auf eine vollständige Benetzung achten.
		Bacillo® Tissues - wischen -	gebr.- fertig 30 Sek.	Alternativ gebrauchsfertiges Einmaltuch entnehmen, wischen und anschließend entsorgen.
		Dismozon® plus - wischen -	0,4 % 1 Std.	Flächen mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem, sauberen Tuch abwischen. Gleichmäßig benetzen. Nicht nachtrocknen.

Die BGR 250, TRBA 250, IfSG und die RKI-Richtlinie müssen berücksichtigt werden.

Was? Maßnahmen	Wann? Häufigkeit	Womit?		Wie? Durchführung
		Präparat / Produkt	Konz. / EWZ	
 Hygienische Händedesinfektion	Nach tatsächlicher wie vermutlicher Kontamination der Hände mit erregerhaltigen Materialien (z.B. Blut, Sekreten). Nach direktem Kontakt mit Kranken. <i>Auch wenn Handschuhe getragen wurden!</i>			Ausreichend Hände-Desinfektionsmittel in die hohle Hand geben, so dass alle Arealen vollständig benetzt werden können. Das Produkt sorgfältig über 30 Sekunden in die Hände einreiben und dabei alle Hautpartien erfassen. Besonderes Augenmerk auf die Fingerkuppen und Daumen legen.
	Chirurgische Händedesinfektion Vor Arbeit am offenen Produkt. <i>Auch wenn Handschuhe getragen wurden!</i>			Aus Spender entnehmen. Vorgang analog hygienischer Händedesinfektion, jedoch zusätzlich auch Unterarme bis zum Ellenbogen einreiben und während der gesamten Einwirkzeit von 1,5 Minuten feucht halten.
 Spezieller Hautschutz	Vor einer die Haut belastenden Tätigkeit. <i>Hautschutzprodukte sind kein Ersatz für Schutzhandschuhe!</i>			Produkt entnehmen und gründlich in die sauberen, trockenen Hände einreiben. Dabei mit dem Handrücken beginnen und besonders auf Fingerzwischenräume und Nagelbetten achten.
 Händepflege	Nach einer die Haut belastenden Tätigkeit. Insbesondere in Pausen und nach Arbeitsende.			Produkt auf den Handrücken geben, von dort gleichmäßig in beide Hände einmassieren. Pflegefilm einziehen lassen. Fingerzwischenräume und Nagelbetten beachten.
 Händereinigung	Vor Arbeitsbeginn um mögliche Sporen zu entfernen. Bei sichtbarer Verschmutzung. Nach Toilettenbesuch. Nach dem Naseputzen.			Hände mit Wasser anfeuchten, Produkt entnehmen und aufschäumen. Anschließend Hände gründlich abspülen und mit Einmalhandtuch trocknen.
 Handschuhe - steril - Handschuhe - unsteril -	Vor der aseptischen Herstellung applikationsfertiger Parenteralia.			Handschuhe über desinfizierte, trockene Hände streifen.
	Vor Kontakt mit offenen Produkt. Vor Arbeit mit hautunverträglichen oder färbenden Substanzen. Vor Kontakt der Hände mit erregerhaltigen Materialien (z.B. Blut, Sekreten). Vor kleineren Reinigungsarbeiten.			Handschuhe über trockene ggf. desinfizierte Hände streifen.
Mund- und Nasenschutz  Kopfhaube Schutzbrille	Bei der Arbeit am offenen Produkt. Bei Kontakt mit sehr feinstaubenden Feststoffen.			Mund- und Nasenschutz anlegen.
	Bei der Arbeit am offenen Produkt. Bei Kontakt mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, deren Substanzen die Augen reizen. Bei Kontakt mit Säuren, Laugen, Lösungsmitteln und Pulvern, deren Stäube die Augen reizen. Bei Kontakt mit ätzenden Stoffen, die verspritzen können.			Hauben müssen so aufgesetzt werden, dass das gesamte Haar verdeckt ist. Schutzbrille aufsetzen.
 Schutzkittel	Bei der Arbeit im Labor. Bei der Arbeit mit gesundheitsschädigenden Stoffen.			Im Labor und bei der Bearbeitung von Rezepturen ist stets ein geschlossener Kittel zum Schutz vor Keimverschleppung einerseits und vor Kontamination mit gesundheitsschädigenden Stoffen andererseits zu tragen.
 Aufbereitung von Dosier- und Spenderpumpen  Aufbereitung des Spendergehäuses	Bei jedem Flaschenwechsel.			Zum Entfernen von Produktresten mit angefeuchtetem Einmal Tuch abwischen und durchspülen. Desinfektionsmittel durchspülen, einwirken lassen und Pumpe anschließend leer pumpen. Nicht nachwischen. Nach Trocknen einsetzen oder staubfrei lagern.
	Bei jedem Flaschenwechsel.			Zum Entfernen von Produktresten mit angefeuchtetem Einmal Tuch abwischen. Gehäuseteil am Pumpenauslauf besonders beachten. Mit einem mit Desinfektionsmittel befeuchteten Einmal Tuch abwischen. Vollständig benetzen, nicht nachwischen. Unzugängliche Flächen einsprühen.
 Flächen-desinfektion - Fläche (allgemein) - Messplatz  - Personenwaage	Nach tatsächlicher wie vermutlicher Kontamination mit erregerhaltigen Materialien.			Flächen mit einem Desinfektionsmittel befeuchteten Einmal Tuch abwischen. Vollständig benetzen, nicht nachwischen. Unzugängliche Flächen einsprühen. Beim Sprühen auf eine vollständige Benetzung achten.
	Messplatz zur Bestimmung von Blutparametern nach Gebrauch bzw. täglich.			Alternativ gebrauchsfertiges Einmal Tuch entnehmen, wischen und anschließend entsorgen.
	Personenwaage nach Gebrauch bzw. täglich.			Flächen mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem, sauberen Tuch abwischen. Gleichmäßig benetzen. Nicht nachtrocknen.
 Flächen-desinfektion - produktberührende Geräte im Herstellungsbereich	Vor Herstellungsbeginn ggf. im Voraus. Bei Bedarf. Nach tatsächlicher wie vermutlicher Kontamination mit erregerhaltigen Materialien.			Flächen mit einem Desinfektionsmittel befeuchteten Einmal Tuch abwischen. Vollständig benetzen, nicht nachwischen. Unzugängliche Flächen einsprühen. Beim Sprühen auf eine vollständige Benetzung achten.
				Alternativ gebrauchsfertiges Einmal Tuch entnehmen, wischen und anschließend entsorgen. Flächen mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem, sauberen Tuch abwischen. Gleichmäßig benetzen. Nicht nachtrocknen.
 Flächen-desinfektion - Abfalleimer	Bei Bedarf bzw. bei tatsächlicher oder vermutlicher Kontamination mit erregerhaltigem Material.			Von außen und innen gründlich mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem angefeuchteten Tuch auswischen. Dabei immer von außen nach innen arbeiten.
 Laminar-Air-Flow	Täglich und vor jeder Tätigkeit.			Flächen mit einem Desinfektionsmittel befeuchteten Einmal Tuch abwischen. Vollständig benetzen, nicht nachwischen. Unzugängliche Flächen einsprühen. Beim Sprühen auf eine vollständige Benetzung achten.
				Alternativ gebrauchsfertiges Einmal Tuch entnehmen, wischen und anschließend entsorgen.
				Flächen mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem, sauberen Tuch abwischen. Gleichmäßig benetzen. Nicht nachtrocknen.

Die BGR 250, TRBA 250, IfSG und die RKI-Richtlinie müssen berücksichtigt werden.