

Pflichtangaben für Werbung:

1. Basistext Endverbraucher (außerhalb der Fachkreise):

#### **Paracetamol 500 mg Die Apotheke hilft Tabletten**

Wirkstoff: Paracetamol

Anwendungsgebiete: Zur symptomatischen Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen (wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen) und/oder von Fieber. Zur Anwendung bei Kindern ab 4 Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen.

Warnhinweise: Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

2. Fach Pflichttext (innerhalb der Fachkreise):

#### **Paracetamol 500 mg Die Apotheke hilft Tabletten**

Wirkstoff: Paracetamol

Zusammensetzung des Arzneimittels: 1 Tablette enthält 500 mg Paracetamol.

Sonstige Bestandteile: Povidon K30, vorverkleisterte Stärke (Mais), Stearinsäure (Ph. Eur.), Magnesiumstearat (Ph. Eur.).

Anwendungsgebiete: Zur symptomatischen Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen (wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen) und/oder von Fieber. Zur Anwendung bei Kindern ab 4 Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen.

Gegenanzeigen: Paracetamol 500 mg Tabletten darf nicht eingenommen werden, wenn Sie allergisch gegen Paracetamol oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels sind. Nehmen Sie Paracetamol 500 mg Tabletten erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Sie chronisch alkoholkrank sind, wenn Sie an einer Beeinträchtigung der Leberfunktion leiden (Leberentzündung, Gilbert-Syndrom), bei vorgeschädigter Niere.

Nebenwirkungen: In seltenen Fällen kann es zu einem leichten Anstieg bestimmter Leberenzyme (Serumtransaminasen) kommen. Sehr selten sind Veränderungen des Blutbildes wie eine verringerte Anzahl von Blutplättchen (Thrombozytopenie) oder eine starke Verminderung bestimmter weißer Blutkörperchen (Agranulozytose), allergische Reaktionen in Form von einfachem Hautausschlag oder Nesselausschlag bis hin zu einer Schockreaktion sowie Verengung der Atemwege (Analgetika-Asthma) bei empfindlichen Personen, schwere Hautreaktion (Stevens-Johnsen-Syndrom, toxische epidermale Nekrolyse, akutes generalisiertes pustulöses Exanthem).

Warnhinweise: Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben.

Apothekenpflichtig

Name und Sitz des pharmazeutischen Unternehmers: Fairmed Healthcare GmbH, Dorotheenstraße 48, 22301 Hamburg

Name und Sitz des Herstellers: Fairmed Healthcare GmbH, Maria-Goeppert-Straße 3, 23562 Lübeck.